


『脊椎関節炎診療の手引き2020』 正誤表

この度は上記書籍をご購入くださりありがとうございます。本書55ページに以下の誤りがございました。訂正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。


2020年7月31日
診断と治療社 編集部

誤： 条件付きで推奨しない
正： 強く推奨する



誤： 条件付きで推奨しない
正： 強く推奨する

(修正反映版)



『脊椎関節炎診療の手引き 2020』

正誤表

この度は上記書籍をご購入くださりありがとうございます。本書に以下の誤りがございました。訂正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

頁	該当箇所	誤	正
47	左段 上から 2 行目	3.5 未満は高疾患活動性, 3.5 以上を超高疾患活動性	3.5 以下 は高疾患活動性, 3.5 を 超える場合 を超高疾患活動性
77	右段 上から 8 行目	両母指の手根中手関節, 第 2~5 趾の DIP 関節を評価し,	両母指の手根中手関節, 第 2~5 指 の DIP 関節を評価し,
87	図 23 説明	MTX: メトトレキサート (わが国適応外)	MTX: メトトレキサート
89	右段 下から 13 行目	TNF 阻害薬による治療を開始する前には必ず, 潜伏結核のスクリーニングが必要であり, 既往がある場合は, 通常予防的抗結核治療を必要とする。	TNF 阻害薬による治療を開始する前には必ず, 潜在性 結核のスクリーニングが必要であり, 既往がある場合は, 通常 潜在性 結核治療を必要とする。
119	左段 下から 5 行目	付着部関連関節炎	付着部 炎 関連関節炎
121	左段 下から 7 行目	足底腱膜炎	足底 筋 膜炎
135	シクロスポリン 投与量/投与間隔/増量・短縮	(乾癬/乾癬性関節炎) 通常, 1 日量を 5mg/kg に 2 回に分けて経口投与する。効果がみられた場合は 1 か月ごとに 1 日 1g/kg ずつ減量し, 維持量は 1 日量 3g/kg を標準とする。なお, 症状により適宜増減する	(乾癬/乾癬性関節炎) 通常, 1 日量を 5mg/kg に 2 回に分けて経口投与する。効果がみられた場合は 1 か月ごとに 1 日 1mg /kg ずつ減量し, 維持量は 1 日量 3mg /kg を標準とする。なお, 症状により適宜増減する