

『最新 NICU マニュアル』改訂第7版 正誤表

上記書籍に、下記の誤りがありました。

訂正するとともに、謹んでお詫び申し上げます。

ページ	箇所	誤	正
132	「4. 高カルシウム血症」POINT	低カルシウム血症が起こりやすい。	高カルシウム血症が起こりやすい。
133	1行目	低カルシウム血症〔副甲状腺ホルモン (parathyroid hormone : PTH) 分泌促進のため〕,	低カルシウム血症〔Mgが軽度低下の場合, 副甲状腺ホルモン (parathyroid hormone : PTH) 分泌促進のため〕,
133	11行目	Mgが <u>低値</u> の場合,	Mgが <u>重度に低下</u> した場合,
134	2~12行目	<p>①細胞外液量不変：<u>抗利尿ホルモン不適切分泌症候群 (syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone : SIADH)</u>によるもの。新生児仮死, ……</p> <p>②細胞外液量減少：体重減少を伴う。 ……</p> <p>③細胞外液量増加：浮腫, ……</p> <p>④希釈性低ナトリウム血症：<u>高血糖, 脂質異常症, 高蛋白症など。</u></p> <p>⑤偽性低ナトリウム血症：高血糖… …</p> <p>⑥副腎不全, 甲状腺機能低下症など。</p>	<p>①細胞外液量不変：新生児仮死, ……</p> <p>②細胞外液量減少：体重減少を伴う。 ……</p> <p>③細胞外液量増加：<u>抗利尿ホルモン不適切分泌症候群 (syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone : SIADH)</u>によるもの。浮腫, ……</p> <p>④偽性低ナトリウム血症：高血糖, ……</p> <p>⑤副腎不全, 甲状腺機能低下症など。</p>

『最新 NICU マニュアル』改訂第7版 正誤表

上記書籍に、下記の誤りがありました。

訂正するとともに、謹んでお詫び申し上げます。

ページ	箇所	誤	正
12	15行目	0.2mL (2mg) を静注	0.4mL (2mg) を静注
12	16行目	0.1mL (1mg) を静注	0.2mL (1mg) を静注
196	表1	肺血症	敗血症