

## 『小児科当直医マニュアル 改訂第 16 版』正誤表

このたびは上記書籍をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございました。訂正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

2024 年 9 月現在

診断と治療社 編集部

ページ	箇所	誤	正
394	下から 1 行目	(p.250「早産低出生体重児・新生児」参照)	(次表を参照)
394	ページの最後に表を追加	※下表を追加	

○追加する表

表 新生児の抗菌薬投与量

一般名(略号)	商品名	用量 [mg/kg/1 回投与量, ( )内は投与間隔時間を示す]						メモ
		体重<1,200g		体重<2,000 g		体重>2,000 g		
		生後<4 週	生後<1 週	1~4 週	生後<1 週	1~4 週	>4 週	
Ampicillin(ABPC)	ピクシリン	50(12 h)	50(12 h)	50(8 h)	50(12 h)	50(8 h)	50(6 h)	髄膜炎では倍量
Piperacillin(PIPC)	ペントシリン	100(12 h)	100(12 h)	100(8 h)	100(12 h)	100(8 h)	100(6 h)	
Ampicillin(ABPC)/Subbactam(SBT)	ユナシン	75(12 h)	75(12 h)	75(8 h)	75(12 h)	75(8 h)	75(6 h)	2 : 1 ABPC として 50 mg, 嫌気性菌
Piperacillin/Tazobactam(PIPC/TAZ)	ゾシン	112.5(12 h)	112.5(12 h)	112.5(8 h)	112.5(12 h)	112.5(8 h)	112.5(6 h)	8 : 1 PIPC として 100 mg, 緑膿菌
Cefazolin(CEZ)	セファメジン, セファゾリン Na	25(12 h)	25(12 h)	25(12 h)	25(12 h)	25(8 h)	25(8 h)	髄液移行は不良
Cefotaxime(CTX)	クラフォラン, セフォタックス	50(12 h)	50(12 h)	50(8 h)	50(12 h)	50(8 h)	50(6 h)	髄液移行良好
Cefmetazole(CMZ)	セファゾリン	20(12h)	20(12 h)	20(12 h)	20(8 h)	20(8 h)	20(8 h)	嫌気性菌
Cefepim(CFPM)	マキシブーム, セフェピム	30(12h)	30(12 h)	30(12 h)	50(12 h)	50(12 h)	50(8 h)	
Meropenem(MEPM)	メロペン, メロベネム	20(12 h)	20(12 h)	20(8 h)	20(8 h)	30(8 h)	30(8 h)	嫌気性菌, Vit. K 欠乏, けいれん, 髄膜炎では 40 mg, 1 時間投与
Amikacin(AMK)	アミカシン硫酸塩	18(48 h)	15(36 h)	15(24 h)	15(24 h)	15(24 h)	15(24 h)	
Gentamicin(GM)	ゲンタシン	5(48 h)	4(36 h)	4(24 h)	4(24 h)	4(24 h)	4(24 h)	
Vancomycin(VCM)	塩酸バンコマイシン	15(24 h)	15(12 h)	15(12 h)	15(12 h)	15(8 h)	15(6 h)	耐性グラム陽性球菌, 1 時間投与
Teicoplanin(TEIC)	タゴシッド	16(24 h)	16(24 h)	16(24 h)	16(24 h)	16(24 h)	10(12 h)	維持量は 8 mg, 30 分投与
Linezolid(LZD)	ザイボックス	10(12 h)	10(12 h)	10(8 h)	10(12 h)	10(8 h)	10(8 h)	遮光, 2 週間以上で骨髄抑制, 1 時間投与
Erythromycin(EM)	エリスロシン	10(12 h)	10(12 h)	10(8 h)	10(12 h)	10(8 h)	10(6 h)	
Clindamycin(CLDM)	ダラシン S	5(12 h)	5(12 h)	5(8 h)	5(8 h)	5(6 h)	7.5(6 h)	嫌気性菌
Amphotericin B (L-AMB)	アムビゾーム	2.5~5 (24 h)	2.5~5 (24 h)	2.5~5 (24 h)	2.5~5 (24 h)	2.5~5 (24 h)	2.5~5 (24 h)	遮光, 髄液移行不良, 2 時間以上掛けて投与, 5%ブドウ糖液で 1 mg/mL 以下の濃度に希釈, 投与ルートは 5%ブドウ糖
Micafungin(MCFG)	ファンガード	10~15 (24 h)	7~10 (24 h)	7~10 (24 h)	7~10 (24 h)	7~10 (24 h)	7~10 (24 h)	髄液・尿路移行不良, 生食または 5%ブドウ糖に希釈し 0.5~1.5 mg/mL の濃度に希釈, 2 時間投与
Fosfluconazole (F-FLCZ)	プロジフ	6(48 h)	6(48 h)	6(24 h)	6(24 h)	6(24 h)	6(24 h)	腎障害では投与間隔延長
Acyclovir(ACV)	ゾビラックス	20(24 h)	20(12 h)	20(8 h)	20(8h)	20(8 h)	20(8 h)	ヘルペスウイルス, 1 時間投与